



## VIDEN FRA DOFBASEN - OM RYLER

AF HENNING HELDBJERG  
OG TIMME NYEGAARD E-MAIL: TIMME.NYEGAARD@DOF.DK

I sensommeren er det vadefuglene, der lokker ude i felten. De smukke adulte fugle i deres yngledragter kommer til landet fra ynglepladserne mod nord, allerede mens det stadig er sommer. Efter få uger trækker de adulte fugle videre sydpå og erstattes gradvist af de juvenile fugle. Under opholdet i Danmark fældes fjerene, og fuglene drager således videre mod overvintrings kvarterer iklædt de grålige vinterdragter. Krumnæbbet Ryle og Dværgryle er almindelige arter, og de adulte fugles træk topper allerede i slutningen af juli, mens de juveniles træk topper i starten af september og fortsætter hen i oktober. Begge arter forekommer i størst antal langs lavvandede kyster i Vadehavet samt i de vestjyske fjorde. Uden for Jylland er det Odense Fjord, Ølsemagle Revle og Vestamager, der har de største forekomster. Mens Dværgrylen er mere kystbundet med store forekomster ved henholdsvis Vestkysten og Østersøen, ses Krumnæbbet Ryle ligeledes i pæne antal på kystnære lokaliteter i de indre farvande, f.eks. Hejlsminde Nor i Sønderjylland og Majbølle Nor på Lolland.

Temmincksryle er mere fåtallig end de to andre arter. De adulte fugle blev i 2004 set frem til midten af august og de juvenile fugle kun sjældent efter september. Denne art forekommer typisk langs mudrede søbredder og ved beskyttede kyster. De største forekomster i efteråret 2004 var i Tøndermarsken, Skjern Enge, Ulvedybet og Tissø.

Ved en sammenligning med 2003 ses det, at der i 2004 var større forekomster af adulte fugle hos både Krumnæbbet Ryle og Temmincksryle. Hos Dværgrylen var der derimod store forekomster af ungfugle i Danmark i 2004, hvilket kan skyldes en god ynglesucces dette år.

DOFbasen er DOF's database over fugleobservationer i Danmark, som alle kan bidrage til. Den har sin egen hjemmeside på adressen [www.dofbasen.dk](http://www.dofbasen.dk).







Viden fra DOFbasen er en fast rubrik i *Fugle i felten*, der i form af korte artikler om fuglelivet i Danmark præsenterer nogle af de mange informationer, der findes i DOFbasen. Grundlaget for denne artikel er 777 observationer af Krumnæbbet Ryle, 594 observationer af Dværgryle og 292 observationer af Temmincksryle for perioden 1. juli – 30. november 2003 og 2004. Datamaterialet er så vidt muligt renset for gengangere på lokalitetsniveau.



Dværgryle. Foto: Poul Reib.



Temmincksryle. Foto: Sune Riis Sørensen.



Kortene viser max-forekomsten af Krumnæbbet Ryle, Dværgryle og Temmincksryle per lokalitet i perioden 1. juli – 30. november 2004. Søjlediagrammerne viser arternes respektive efterårsforekomster i 10-dages perioder i 2003 og 2004.